CHOLESTERINUM – CHOLESTEROL

Pathogenese

Friedrich Witzig

Gemüt 3
Schwindel 4
Kopf 5
Auge 5
Sehen 6
Ohren 7
Hören 7
Nase 7
Gesicht 7
Mund 8
Zähne 9
Innerer Hals 9
Äußerer Hals 9
Magen 10
Abdomen 12
Rektum 16
Stuhl 17
Blase 17
Nieren 17
Urin 17
Männliche Genitalien 18
Weibliche Genitalien 19
Atmung 19
Husten 19
Auswurf 20
Brust 20
Herz, Kreislauf 21
Rücken 21
Extremitäten 22
Schlaf 22
Träume 23
Frost 23
Fieber 23
Schweiß 23
Haut 23
Allgemein 25
Stages of Life, Constitution 36
Vergleichende Arzneien 38

Quellen 39

Gemüt

Angst

- Angst (CSE-Hemmer). [akb]
- Angst (Fluvastatin). [akb]
- Angst (Lovastatin). [akb]
- Angst (Pravastatin). [akb]
- Angst (Rosuvastatin). [akb]
- Angst (Simvastatin). [akb]
- Psychische Störungen einschl. Angstzustände (Lovastatin). [hrh]

Arbeiten

- Ist unfähig seiner Arbeit nachzugehen. [ygw]

Betäubung

- Benommenheit (Atorvastatin). [akb]
- Benommenheit (Lovastatin). [akb]
- Benommenheit (Pravastatin). [akb]

Ehrgeiz

- Hat seit langer Zeit wieder mehr Ehrgeiz. [ygw]

Empfindlich

- In seltenen Fällen aber ein offensichtliches Hypersensitivitätssyndrom (Lovastatin). [hrh]

Entwicklung

- Die Kranken mit Mevalonazidurie leiden nach *Hoffmann* 1994 seit der Geburt an schweren Gedeihstörungen, körperlichen und psychomotorischen Entwicklungsstörungen, Durchfällen usw. [hrh]
- Psychomotorische Retardierung. [hrh]

Erschöpfung

- Abgeschlagenheit (Lovastatin). [akb]

Gedächtnis

- Gedächtnisstörung (Atorvastatin). [akb]
- Gedächtnisstörung (CSE-Hemmer). [akb]
- Gedächtnisstörung (Rosuvastatin). [akb]

Geschäftig

- Hat im Laden Rechnungen geschrieben und hat des Guten zu viel getan. [ygw]

Langsamkeit

- Einschränkung des Reaktionsvermögens (CSE-Hemmer). [akb]

Leiden

- Bei Gallenkoliken leidet der Patient so sehr, dass es fast nicht möglich ist, von ihm Symptome aufzunehmen. [ahc]

Mutig

- Er ist ein mutiger Zeitgenosse. [btj]

Reisen

- Er ist ein passionierter Ozeanreisender. [btj]

Reizbarkeit

- Große Gereiztheit. [aew]

Ruhelosigkeit

- Nervosität (CSE-Hemmer). [akb]
- Sehr nervös, ängstliche Besorgtheit. [btj]

Schlafwandeln

- Schlafwandeln (Pravastatin). [akb]

Traurigkeit

- Depression (CSE-Hemmer). [akb]
- Depression (Lovastatin). [akb]
- Depression (Pravastatin). [akb]
- Depression (Rosuvastatin). [akb]
- Depression (Simvastatin). [akb]
- Nicht gesicherte, aber gemeldete Depression (Lovastatin). [hrh]
- Nicht weniger von Bedeutung sind die Traurigkeit und der Konzentrationsmangel, die die Leberbeschwerden gewöhnlich begleiten. [crv]

Vertrauen

- In die Mittelwahl, Nux-v., seines vorherigen Homöopathen hatte er ein unbändiges Vertrauen. [btj]

Verzweiflung

- Sehr mutlos und verzweifelt. [ygw]

Wahnidee

- hart arbeiten zu müssen. [ygw]
- Ist die meiste Zeit vollkommen frei von Schmerz, aber verspürt die Neigung nach schwerer Tagesarbeit, wie ein Cash-Carrier zu funktionieren, was bewirkt, sich noch nach mehr zu strecken. [ygw]

Schwindel

- Es wurde berichtet über Schwindel (Lovastatin). [hrh]
- Schwindel (2%) (Fluvastatin). [akb]
- Schwindel (2%) (Lovastatin). [akb]
- Schwindel (3%) (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Schwindel (3%) (Pravastatin). [akb]
- Schwindel (Atorvastatin). [akb]

- Schwindel (CSE-Hemmer). [akb]
- Schwindel (Rosuvastatin). [akb]
- Schwindel (Simvastatin). [akb]

Kopf

Atrophie

- Es treten Kleinhirnatrophien und ataktische Bewegungsstörungen auf und viele Kinder sterben als Säuglinge und im Kleinkindalter. [hrh]
- Zerebelläre Atrophie. [hrh]

Haare

- Alopezie (0,5-1%) (Lovastatin). [akb]
- Alopezie (Atorvastatin). [akb]
- Alopezie (CSE-Hemmer). [akb]
- Alopezie (Pravastatin). [akb]
- Alopezie (Simvastatin). [akb]
- Nicht gesicherte, aber gemeldete Alopezie (Lovastatin). [hrh]

Schmerz

- Das Lebersyndrom wurde von einer dumpf ziehenden Empfindung in der unteren Occipitalregion angekündigt und über die rechte Kopfhälfte nach unten in die rechte Brust, in die Leberregion ausbreitet. [crv]
- Im Kopf bemerkte er eine dumpfe quetschende Empfindung. [crv]
- Kopfschmerz auf dem Scheitel. [ygw]
- Kopfschmerzen (3,5%) (Simvastatin). [akb]
- Kopfschmerzen (5%) (Pravastatin). [akb]
- Kopfschmerzen (6%) (Rosuvastatin). [akb]
- Kopfschmerzen (8%) (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Kopfschmerzen (9%) (Fluvastatin). [akb]
- Kopfschmerzen (9%) (Lovastatin). [akb]
- Kopfschmerzen (bis 17%) (Atorvastatin). [akb]
- Kopfschmerzen (CSE-Hemmer). [akb]
- Kopfschmerzen (Lovastatin). [hrh]
- Migräne (Simvastatin). [akb]
- Weniger Kopfschmerzen [nach Cholesterinum]. [ygw]

Auge

Blutung

- Augenblutung (CSE-Hemmer). [akb]

Farbe

- Conjunctivae wenig gelblich gefärbt. [aew]
- Gelbe Skleren. [btj]
- Opal-weißlicher Hornhautring. [vnh]

Katarakte

- Cholesterin in cataractösen Linsen. [aew]
- Katarakt (0,5%) (Simvastatin). [akb]
- Katarakt (CSE-Hemmer). [akb]
- Katarakte (Tierexperimentell). [hrh]
- Katarakte. [hrh]

Lähmung

- Augenmuskellähmung (CSE-Hemmer). [akb]

Schmerz

- Beim Erwachen Hitze und brennend stechender Schmerz in den Lidern (3. Tag). [snp]
- Schwerer dumpfer Schmerz in den Augenbrauen und dem Dach der Orbita (3. Tag). [snp]

Trockenheit

- Augentrockenheit (Atorvastatin). [akb]
- Augentrockenheit (Lovastatin). [akb]

Trübung

- Linsentrübungen. [hrh]
- Bei einer bestimmten Untersuchung am Hund wurden vereinzelt Linsentrübungen beobachtet (Lovastatin). [hrh]
- fragliche Linsentrübungen. [hrh]
- Glaskörper und Linse. [bew] [vnh]
- Linsentrübung, (CSE-Hemmer). [akb]

Sehen

Diplopie

- Doppeltsehen (Lovastatin). [akb]
- Doppeltsehen (Pravastatin). [akb]
- Doppeltsehen (Simvastatin). [akb]

Sehstörung

- Sehstörungen (CSE-Hemmer). [akb]
- Sehstörungen (Pravastatin). [akb]
- Sehstörungen (Simvastatin). [akb]

Schwachsichtig

- Amblyopie (Atorvastatin). [akb]

Verschwommen

- Es wurde berichtet über verschwommen Sehen (Lovastatin). [hrh]
- verschwommenes Sehen (1,5%) (Lovastatin). [akb]
- verschwommenes Sehen (Pravastatin). [akb]

Ohren

Farbe

- Merkwürdig ist, dass im Schmerzanfall sich das rechte Ohr entfärbt, „weiß wird," während das andere Ohr rot bleibt. [gon]

Hören

- Hörstörung (CSE-Hemmer). [akb]
- Tinnitus (Atorvastatin). [akb]
- Tinnitus (CSE-Hemmer). [akb]

Nase

Bluten

- Nasenbluten (Atorvastatin). [akb]

Entzündung

- Rhinitis (2%) (Rosuvastatin). [akb]
- Rhinitis (3%) (Pravastatin). [akb]
- Rhinitis (5%) (Fluvastatin). [akb]
- Rhinitis (Atorvastatin). [akb]
- Rhinitis (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Sinusitis (2%) (Rosuvastatin). [akb]
- Sinusitis (3%) (Fluvastatin). [akb]
- Sinusitis (4-5%) (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Sinusitis (bis 6%) (Atorvastatin). [akb]

Polypen

- Nasenpolypen (Atorvastatin). [akb]

Schmerz

- Dumpfer, schwerer Schmerz direkt über der Nasenwurzel, am Morgen (8. Tag). [snp]

Gesicht

Aussehen

- Aussehen gesund. [aew]

Farbe

- Gelbliche Gesichtsfarbe. [aew]

- Gesicht gerötet, danach gelb. [ygw]
- Gesichtsfarbe wird gelb, wie früher vor einer schweren Gallenkolik. [ygw]
- Starke Blässe, dann Gelbverfärbung. [ygw]
- Teint etwas ikterisch. [aew]

Hautausschlag

- Akne (Atorvastatin). [akb]

Schwellung

- Gesichtsödem (Atorvastatin). [akb]
- Gesichtsödem (CSE-Hemmer). [akb]
- Gesichtsödem (Fluvastatin). [akb]

Mund

Blutung

- Zahnfleischblutung (CSE-Hemmer). [akb]

Belag

- Die Zunge ist etwas weißlich belegt. [gon]
- Zunge schmutzig weiß belegt, gelblicher Auswurf. [ygw]

Entzündung

- Cheilitis (Atorvastatin). [akb]
- Cheilitis bedeutet Lippenentzündung und ist verbunden mit rissigen Lippen (CSE-Hemmer). [akb]
- Gingivitis (CSE-Hemmer). [akb]
- Gingivitis (Simvastatin). [akb]
- Glossitis (Atorvastatin). [akb]
- Nicht gesicherte, aber gemeldete Stomatitis (Lovastatin). [hrh]
- Stomatitis (Atorvastatin). [akb]
- Stomatitis (CSE-Hemmer). [akb]
- Stomatitis (Lovastatin). [akb]

Geschmack

- Fader Mundgeschmack. [aew]
- Geschmackstörungen (Lovastatin). [hrh]
- Störung des Geschmacksinns (1%) (Lovastatin). [akb]
- Störung des Geschmacksinns (Atorvastatin). [akb]
- Störung des Geschmacksinns (Fluvastatin). [akb]
- Störung des Geschmacksinns (Pravastatin). [akb]
- Störung des Geschmacksinns (Simvastatin). [akb]

Geschwür

- Mundschleimhautgeschwür (Atorvastatin). [akb]

Hyperplasie

- Gingivahyperplasie (Simvastatin). [akb]

Speichelfluss

- Vieles Geifern. [aew]

Trockenheit

- Mundtrockenheit (0,5-1%) (Lovastatin). [akb]
- Mundtrockenheit (Atorvastatin). [akb]
- Mundtrockenheit (CSE-Hemmer). [akb]
- Mundtrockenheit (Lovastatin). [hrh]
- Mundtrockenheit (Simvastatin). [akb]

Zähne

- Abszess, parodontaler (Rosuvastatin). [akb]
- Parodontopathie (Rosuvastatin). [akb]
- Zahnaffektion (2%) (Fluvastatin). [akb]

Innerer Hals

Entzündung

- Ösophagitis (Atorvastatin). [akb]
- Rachenentzündung (4%) (Fluvastatin). [akb]
- Rachenentzündung (9%) (Rosuvastatin). [akb]
- Rachenentzündung (2-3%) (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Rachenentzündung (bis 2,5% (Atorvastatin). [akb]

Infektion

- Atemwegsinfektion - obere (13%) (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]

Schlucken

- Schluckstörung (CSE-Hemmer). [akb]
- Schluckstörung (Atorvastatin). [akb]

Äußerer Hals

Krebs

- Kanzerogenität möglich - nach Hochdosierungen bei Ratten vermehrt follikuläre Adenome und Karzinome der Schilddrüse (Fluvastatin). [akb]

Schilddrüse

- Schilddrüsenfunktionsstörung (Rosuvastatin). [akb]

Magen

Appetit

- Appetit deprimiert. [aew]
- Appetit etwas verringert. [aew]
- Appetit gut, keine Verdauungsstörungen. [aew]
- Appetitlosigkeit (CSE-Hemmer). [akb]
- Appetitlosigkeit (Lovastatin). [akb]
- Appetitsteigerung (Atorvastatin). [akb]
- Kein Appetit, Speisen bereiten Übelkeit. [ygw8]
- Leidet seit vier Jahren an vermindertem Appetit. [aew]
- Mundtrockenheit. Er war in der Ernährung so zurückgegangen, dass man seiner Auflösung entgegensehen zu müssen glaubte. [gon]

Aufstoßen

- Aufstoßen (Atorvastatin). [akb]
- Häufiges Luftaufstoßen vor und nach dem Essen. [aew]

Brechreiz

- Brechreiz (6%) (Pravastatin). [akb]
- Brechreiz (Atorvastatin). [akb]
- Brechreiz (CSE-Hemmer). [akb]

Empfindlichkeit

- Der Magen war auf Druck sehr empfindlich. [aew]

Entzündung

- Gastritis (Atorvastatin). [akb]
- Gastritis (Rosuvastatin). [akb]
- Gastroenteritis (Atorvastatin). [akb]
- Gastroenteritis (Rosuvastatin). [akb]

Erbrechen

- Dazu gesellt sich Erbrechen und während der ganzen Zeit stark verminderter Appetit. [aew]
- Erbrechen (1%) (Simvastatin). [akb]
- Erbrechen (3%) (Fluvastatin). [akb]
- Erbrechen (6%) (Pravastatin). [akb]
- Erbrechen (Atorvastatin). [akb]
- Erbrechen (bis 4%) (Lovastatin). [akb]
- Erbrechen (CSE-Hemmer). [akb]
- Erbrechen (Lovastatin). [hrh]
- Erbrechen von viel geruchloser, heißer Flüssigkeit. [ywa]

- Erbricht Galle und wird sehr gelb. [ygw]
- Nichts konnte sie im Magen behalten – (Nothing would stay oil the stomach). [btj]

Geschwür

- Magengeschwür (Atorvastatin). [akb]

Schmerz

- [Die Magenschmerzen] kamen in sehr heftigen Anfällen. [aew]
- Andern Tags trat noch ein heftiger Anfall auf, dann nicht wieder (nach Cholesterin). [aew]
- Die Schmerzen [Magen] erstreckten sich bis zur rechten Schulter und Kreuzgegend. [aew]
- Erbricht viel heißes Wasser, nicht sauer, geruchlos. [ygw]
- Magenkrämpfe (Lovastatin). [akb]
- Zeitweise, vom Essen unabhängige „Magenschmerzen“, die sich bis in die Brust und rechte Schulter erstrecken. [aew]

Sodbrennen

- Seit den Gallenkoliken vor 4 und 11 Tagen ist der Magen sehr sauer. [ygw]
- Sodbrennen (1%) (Lovastatin). [akb]
- Sodbrennen (3%) (Pravastatin). [akb]
- Sodbrennen (bis 2%) (CSE-Hemmer). [akb]
- Sodbrennen (Lovastatin). [hrh]

Übelkeit

- Das quälendste Symptom war eine grässliche, teilweise Übelkeit verursachende Empfindung in der unteren Leberregion. [crv]
- Nahrung verursacht Übelkeit. [ywa]
- Übelkeit - bei Kombination mit Statin (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Übelkeit (1%) (Simvastatin). [akb]
- Übelkeit (3%) (Fluvastatin). [akb]
- Übelkeit (3%) (Rosuvastatin). [akb]
- Übelkeit (7%) (Pravastatin). [akb]
- Übelkeit (Atorvastatin). [akb]
- Übelkeit (bis 4%) (Lovastatin). [akb]
- Übelkeit (bis 6%) (CSE-Hemmer). [akb]
- Übelkeit [nach Gallenkolik]. [ygw]

Verdauung

- Dyspepsie (1%) (Simvastatin). [akb]
- Dyspepsie (3%) (Rosuvastatin). [akb]
- Dyspepsie (4%) (Lovastatin). [akb]
- Dyspepsie (8%) (Fluvastatin). [akb]
- Dyspepsie (CSE-Hemmer). [akb]

- Gastrointestinale Symptome (0,3%). [hrh]
- Gastrointestinale Symptome. [hrh]
- Langsame Verdauung. [vnh5]
- Magen-Darm-Störung (6%) (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Magen-Darm-Störung (CSE-Hemmer). [akb]

Völlegefühl

- Vollheitsgefühl nach dem Essen. [aew]
- Völlegefühl (CSE-Hemmer). [akb]

Abdomen

Bähungen

- Blähungen - bei Kombination mit Statin (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Blähungen (2%) (Simvastatin). [akb]
- Blähungen (3%) (Fluvastatin). [akb]
- Blähungen (3%) (Pravastatin). [akb]
- Blähungen (bis 5%) a (Atorvastatin). [akb]
- Blähungen (bis 6%) (Lovastatin). [akb]
- Blähungen (CSE-Hemmer). [akb]
- Es wurde berichtet über Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Übelkeit, Verdauungsstörungen (Lovastatin). [hrh]

Blutandrang

- Leberhyperämie. [ane]

Empfindlichkeit

- Die Lebergegend ist ungleich empfindlicher als das Präcordium. [aew]
- Leber sehr empfindlich und schmerzhaft; Druck ist sehr schmerzhaft, am schlimmsten in der Gegend des Gallenganges. [ywa]
- Linker Leberlappen empfindlicher als die Magengegend, Vergrößerung nicht nachzuweisen. [aew]
- Meine Untersuchung ergab eine auffallende Empfindlichkeit der Lebergegend bei scheinbar normaler Größe dieses Organs. [aew]

Entzündung

- Cholezystitis (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Enteritis (Atorvastatin). [akb]
- Hepatitis (Atorvastatin). [akb]
- Hepatitis (CSE-Hemmer). [akb]
- Hepatitis (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Hepatitis (Lovastatin). [hrh]
- Hepatitis. [hrh]
- Kolitis (CSE-Hemmer). [akb]

- Nicht gesicherte, aber gemeldete Pankreatitis (Lovastatin). [hrh]
- Pankreatitis (CSE-Hemmer). [akb]
- Pankreatitis (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Pankreatitis (Pravastatin). [akb]
- Pankreatitis akute (Atorvastatin). [akb]
- Pankreatitis akute (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Pankreatitis, akute (Fluvastatin). [akb]
- Pankreatitis, akute (Lovastatin). [akb]
- Pankreatitis, akute (Simvastatin). [akb]

Erschütterung

- Jahrelang hatte dieser Mann aus der Grafschaft die Fahrt mit der Kutsche nur als unangenehm empfunden, aber zuletzt war die Fahrt so schmerzhaft, dass er mit der Hand die Schwellung halten und unterstützen musste, um die Auswirkungen der Erschütterung zu verhindern. [btj]

Fibrose

- Leberfibrose - Verdachtsbericht (Pravastatin). [akb]
- Leberfibrose (Simvastatin). [akb]

Gallensteine

- Cholelithiasis (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Wahrscheinlich existierten Gallensteine, aber neben den akuten Anfällen bestanden auch chronische Beschwerden in der Gegend, die mit Schwellung und Empfindlichkeit beschrieben wurden. [btj]

Insuffizienz

- Leberinsuffizienz (bis 2%) (CSE-Hemmer). [akb]

Katarrh

- Als Patient hatte er lange unter Gallenblasenkatarrh gelitten. [btj]

Krebs

- Bei der Behandlung der Carcinome, zumal der Lebercarcinome scheint es mir berufen, eine Rolle zu spielen. [aew]
- Es soll Leberkrebs geheilt haben. [bal]
- I believe I have twice cured cancer of the liver -with it; and in obstinate hepatic engorgements that, by reason of their obstinacy, make one thing interrogatively of cancer, the effects of are very satisfactory; 'at times even striking. [btj]
- Leber. [ahc] [bew] [can]
- Semi-malignant affection involving the left lobe of the liver and what lies between it and the pylorus and the pancreas; Semi-maligne Erkrankung des linken Leberlappens und was zwischen Pylorus und Pankreas liegt. [bda] [btj]

Leber

- Die Leberbeschwerden flackerten immer wieder auf. [aew]
- Leberschaden (CSE-Hemmer). [akb]

- Leberschaden (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Organische Lebererkrankungen, wenn herkömmliche Lebermittel versagten. [bal]
- Durch die giftige Wirkung von Aluminium, die sich in meinem Fall ein halbes Leben hingezogen hat, blieb meine Leber Anlass für Krankheit. [crv]

Nekrosen

- Lebernekrose (Fluvastatin). [akb]
- Lebernekrose (Lovastatin). [akb]
- Lebernekrose, fulminante (Pravastatin). [akb]

Schmerzen

- Abdominalschmerzen (3%) (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Abdominalschmerzen (3%) (Pravastatin). [akb]
- Abdominalschmerzen (bis 3%) (Simvastatin). [akb]
- Abdominalschmerzen (bis 4%) (Atorvastatin). [akb]
- Abdominalschmerzen (bis 6%) (CSE-Hemmer). [akb]
- Anfallsweise. [gon]
- Bauchschmerz (Lovastatin). [hrh]
- Die Anfälle kommen und gehen plötzlich. [ygw]
- Es sind angeblich heftig stechende Schmerzen, die ½ Stunde dauern. [gon]
- häufig Abdominalschmerzen (5%) (Fluvastatin). [akb]
- häufig Abdominalschmerzen (bis 5%) (Lovastatin). [akb]
- Ist der Patient während eines solchen Paroxysmus im Freien, so muss man ihn führen oder er muss sich rasch setzen, so intensiv sind die Schmerzen doch noch. [gon]
- Leibschmerzen auch bei geregeltem Stuhlgang. [gon]
- Wütende, zu bestimmter Tageszeit wiederkehrende Leibschmerzen. [gon]

Gallenblasenregion

- Die Schmerzen sind immer oberhalb des Nabels, mehr nach rechts zu, was ja der Gallenblasengegend entspricht. [gon]
- Fast spezifisch für Gallensteinkoliken, die Schmerzen sofort erleichternd. [ahc]
- Gallenkolik. [ane]
- Gelegentlich etwas Beschwerden in der rechten Seite. [ygw]
- Seit einer Woche schmerzte die [rechte] Seite mit einem Völlegefühl und hatte heute eine Gallenkolik, die fünf Minuten anhielt. [ygw]
- Stoßender Schmerz in der Region des Gallengangs. [ygw]
- Vor ca. zwei Wochen ein plötzlicher Anfall von Gallenkolik um 19 Uhr. [ygw]

Leber

- [Leberschmerz], Beugen nach vorne oder jede Bewegung, die die Seite erschüttert, ist schmerzhaft. [ygw]
- Die Beschwerden sitzen im linken Leberlappen nach links zum Nabel ausstrahlend. [btj]

- Die Lebergegend ist sehr empfindlich und wund, empfindlich bei Erschütterung, schlimmer in Seitenlage. [ygw]
- Die Schmerzen [in der Lebergegend] erstreckten sich bis zur rechten Schulter und Kreuzgegend, kamen in sehr heftigen Anfällen und gingen nie mit Ikterus einher. [aew]
- Drängender Schmerz in der Gegend des Gallenganges. [ywa]
- Erschütterung, agg. [vnh]
- Leber. [can] [vnh]
- Linker Leberlappen bei Druck empfindlicher als die Magengegend, scheinbar nicht vergrößert. [aew]
- Nun ist die Leber sehr empfindlich und wund; Druck von vorne und von hinten ist sehr schmerzhaft, besonders in der Gegend des Gallenganges. [ygw]

Seite

- Brennender Schmerz in der Seite. [bew]
- Weil es ihn so schmerzt [in der Seite], hält er beim Gehen die Hand auf die Seite. [bew]

Schwellung

- Angezeigt bei chronischer Leberschwellung, wenn Zweifel bestehen an deren Malignität. [bal]
- Die Leber oder Pankreas sind geschwollen, möglicherweise eine bösartige Erkrankung des linken Leberlappens. [btj]
- Schwellung unter den rechten Rippen, die von Spezialisten als krebsartig diagnostiziert wurde. [btj]

Stauung

- Cholestase (Atorvastatin). [akb]
- Cholestase (CSE-Hemmer). [akb]
- Cholestase (Lovastatin). [akb]
- Obstinate hepatic engorgement; hartnäckige Leberstauung. [bda]

Steine

Gallensteine

- In Gallensteinen, die der Hauptmasse nach aus Cholesterin bestehen. [aew]

Vergrößerung

- Hartnäckige Lebervergrößerung. [bew]
- Hepatosplenomegalie. [hrh]
- Hilfreich bei Vergrößerung der Leber mit Leberkoliken, entweder wegen Gallensteinen oder eingedickter Galle. [bal]
- In einem Fall war die Leber zuletzt um ein Drittel größer als normal; sie hatte jetzt wieder normale Größe. [crv]
- Leber. [ahc] [vnh]
- Milzvergrößerung (Lovastatin). [akb]
- Wurde wegen vergrößerter Leber behandelt mit viel Calomel und Chloral. [btj]

Völlegefühl

- Beachtliches Völlegefühl und Gefühl von starker Auftreibung der Leber. [snc]

Tumor

- Der Tumor verschwand langsam, die Leber bildete sich zurück in den Zustand, wie er 40 Jahre krank bestanden hatte, der linke Leberlappen war etwas prall gefüllt. [btj]
- Ein großer Tumor, eindeutig mit dem linken Leberlappen verbunden. [btj]

Zirrhose

- Leberzirrhose (Fluvastatin). [akb]

Rektum

Diarrhoe

- Diarrhoen (CSE-Hemmer). [akb]
- Diarrhö (bis 5%) (Atorvastatin). [akb]
- Diarrhö (3-4%) (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Diarrhö (5%) (Fluvastatin). [akb]
- Diarrhö (5%) (Lovastatin). [akb]
- Diarrhö (5%). (Pravastatin). [akb]
- Diarrhö (3%) (Rosuvastatin). [akb]
- Diarrhö (bis 2%) (Simvastatin). [akb]

Flatus

- Viel Flatus, die den Darm nur schwer verlassen. [aew]

Hämorrhoiden

- Hämorrhoidalknoten. [aew]

Obstipation

- Äußerst verstopft (10-15. Tag). [snp]
- Der Kranke litt damals an 8tägiger Hartleibigkeit. [gon]
- Die Darmbewegung ist sehr träge und es ist unmöglich, sie zu beschleunigen (10-15. Tag). [snp]
- Die Verstopfung ist überhaupt nicht schmerzhaft (10-15. Tag). [snp]
- Dreitägige Obstruction. [aew]
- Obstipation - bei Kombination mit Statin (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Obstipation (2%) (Simvastatin). [akb]
- Obstipation (3%). (Fluvastatin). [akb]
- Obstipation (4%) (Pravastatin). [akb]
- Obstipation (5%) (Lovastatin). [akb]
- Obstipation (bis 2,5%) (Atorvastatin). [akb]
- Obstipation (CSE-Hemmer). [akb]
- Obstipation mäßigen Grades. [aew]

Schmerz

- Tenesmus (Atorvastatin). [akb]

Stuhl

- Blut im Stuhl (CSE-Hemmer). [akb]
- Die Stühle sehr lang, aber nicht sehr groß, aber sehr trocken (10-15. Tag). [snp]
- Nach jedem heftigen Anfall war vorübergehend „der Stuhl weiß und der Urin dunkel“. [aew]
- Stuhl normal. [aew]

Blase

Entzündung

- Harnweginfektionen (Atorvastatin). [akb]
- Harnwegsinfektion (2%) (Rosuvastatin). [akb]

Schmerz

- Dysurie (Pravastatin). [akb]
- Nykturie (Pravastatin). [akb]

Urinnieren

- Miktionsstörung (CSE-Hemmer). [akb]
- Miktionsstörung (Pravastatin). [akb]

Nieren

Degeneration

- Diabetes — bei fettiger Degeneration der Nieren. [aew]

Harnsperre

- Oligurie (CSE-Hemmer). [akb]

Schmerzen

- Nierenschmerzen (CSE-Hemmer). [akb]

Versagen

- Akutes Nierenversagen (CSE-Hemmer). [akb]
- In wenigen Fällen kam es zu schweren Rhabdomyolysen mit nachfolgendem Nierenversagen (Lovastatin). [hrh]
- Niereninsuffizienz (CSE-Hemmer). [akb]
- Nierenversagen (CSE-Hemmer). [akb]

Urin

Blut

- Hämaturie (CSE-Hemmer). [akb]

Cholesterin

- Cholesterin im Harn bei Ikterus. [aew]

Protein

- Proteinurie - dosisabhängig (Rosuvastatin). [akb]
- Proteinurie (Simvastatin). [akb]

Reichlich

- Vor den Gallenkoliken reichlich Urin; danach spärlich und dunkel. [ygw]

Mevalonazidurie

- Nach *Hoffmann* 1994 ist zu erwarten, dass künftig auch Mevalonazidurien festgestellt werden, bei denen ein nachfolgendes Enzym, wie die Mevalonatphosphokinase bzw. die Mevalonpyrophosphat Decarboxylase, vermindert gebildet wird. [hrh]

Sand

- Nach Einnahme von Cholesterin reichlich Absonderung von rotem Sand, der den Boden des Gefäßes bedeckte. [ygw]
- Weniger Sand im Urin. [ygw]

Sediment

- Myoglobinurie, Myoglobulinämie (CSE-Hemmer). [akb]

Zucker

- Diabetes mellitus (Rosuvastatin). [akb]
- Hyperglykämie (Rosuvastatin). [akb]
- Hyperglykämische Stoffwechsellage. [hrh]

Männliche Genitalien

Degeneration

- Cholesterin in degenerierten Ovarien und Hoden. [aew]

Erektion

- Eine erste Bestätigung hierfür war die Beobachtung der Störung der Testosteronsynthese, die de fakto unter allen CSE-Hemmstoffen zu erwarten ist, die zu einer Impotenz bei Männern führt. [hrh]
- Erektionsstörung (Pravastatin). [akb]
- Erektionsstörungen (Lovastatin). [akb]
- Impotenz (Atorvastatin). [akb]
- Impotenz (CSE-Hemmer). [akb]
- Impotenz (Lovastatin). [akb]
- Impotenz beim männlichen Geschlecht. [hrh]
- Libidoverlust (Fluvastatin). [akb]
- Sexuelle Impotenz (bei Männern). [hrh]

Samen

- Azoospermie (Lovastatin). [akb]

Sexuelles Verlangen

- Libidoverlust (Lovastatin). [akb]
- Libidoverlust (Pravastatin). [akb]
- Libidoverlust (Simvastatin). [akb]

Weibliche Genitalien

Degeneration

- Cholesterin in degenerierten Ovarien und Hoden. [aew]

Kugel

- Dieselben beginnen „wie von einer aufsteigenden Kugel" in der Uterusgegend bis in den Magen und Rücken. [aew]

Lageanomalie

- Uterus etwas antevertiert. [aew]

Schmerz

- brennend. [aew]
- Die Empfindung wird als ein heftiges Brennen wie von heißem Eisen bezeichnet. [aew]
- Dieselben [Schmerzen] beginnen „wie von einer aufsteigenden Kugel“ in der Uterusgegend bis in den Magen und Rücken. [aew]

Sexuelles Verlangen

- Libidoverlust (Lovastatin). [akb]
- Libidoverlust (Pravastatin). [akb]
- Libidoverlust (Simvastatin). [akb]

Atmung

Atemnot

- Dyspnoe (Atorvastatin). [akb]
- Dyspnoe (Lovastatin). [akb]
- Dyspnoe (Rosuvastatin). [akb]
- Dyspnoe (Simvastatin). [akb]
- Er litt immer unter Atemnot. [btj]
- Unfähig, tief zu atmen. [ywa]

Asthma

- Asthma bronchiale (Atorvastatin). [akb]
- Asthma bronchiale (Rosuvastatin). [akb]

Husten

- Husten (2-4%) (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Husten (2%) (Fluvastatin). [akb]

- Husten (3%) (Pravastatin). [akb]
- Husten (Rosuvastatin). [akb]
- Husten (Simvastatin). [akb]

Trocken

- Trockener Husten, ein bis zwei auf einmal. [ygw]

Auswurf

- Cholesterin im Auswurf, tuberculöser. [aew]

Brust

Entzündung

- Bronchitis (Atorvastatin). [akb]
- Bronchitis (2%) (Fluvastatin). [akb]
- Bronchitis (Rosuvastatin). [akb]
- Pneumonie (Rosuvastatin). [akb]

Infektionen

- Atemwegsinfektion (12%) (Fluvastatin). [akb]
- Atemwegsinfektion - obere (5%) (Pravastatin). [akb]
- häufig Atemwegsinfektion (2%) (Simvastatin). [akb]

Krebs

- Mammakarzinom – vermehrt Brustkrebs unter Pravastatin (4,2%) in Placebo (0,3%)-kontrollierte Studie, durch andere Untersuchungen nicht bestätigt (Pravastatin). [akb]

Schmerz

- Brustschmerz (Atorvastatin). [akb]
- Brustschmerzen (0,5-1%) (Lovastatin). [akb]
- Brustschmerzen (3%) (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Brustschmerzen (3%) (Pravastatin). [akb]
- Brustschmerzen (Rosuvastatin). [akb]
- In der Brust konnte man die Lage der Leber leicht am Schmerz und der Schwere empfinden. [crv]
- Kleiner, scharfer Schmerz in der linken Seite der Brust, ca. achte Rippe (1. Tag). [snp]
- Rheumatische Intercostalschmerzen in den Seiten der Brust und in einem Fleck von der Größe eines Dollars unter der linken Scapula, konstant drei Tage lang (7. Tag). [snp]

Spannung

- Gefühl von Spannung in der Brust, besonders links vom Sternum (6. Tag). [snp]

Tumor

- Mammatumor - vermehrt Brustkrebs unter Pravastatin (4,2%) in Placebo (0,3%)-kontrollierte Studie, durch andere Untersuchungen nicht bestätigt. [akb]

Herz, Kreislauf

EKG

- EKG-Veränderungen (Fluvastatin). [akb]

Erweiterung

- Vasodilatation (Atorvastatin). [akb]
- Vasodilatation (Rosuvastatin). [akb]

Herzklopfen

- Palpitationen (Atorvastatin). [akb]
- Palpitationen (Rosuvastatin). [akb]

Herzmuskel

- Die Verminderung von Ubichinon-10 sei kürzlich auch die Ursache einer sich verschlechternden Herzfunktion bei Kardiomyopathie gewesen (*Folkers* et al. 1990), die sich sofort nach Absetzen des CSE-Hemmers gebessert habe (Lovastatin). [hrh]
- Kardiomyopathien. [hrh]

Puls

- Herzrhythmusstörungen (Atorvastatin). [akb]
- Herzrhythmusstörungen (Rosuvastatin). [akb]
- Kleiner Puls und schwach, die Patientin schien dem Tode geweiht. [btj]
- Sinusbradykardie (Fluvastatin). [akb]
- Synkope (Atorvastatin). [akb]
- Synkope (Rosuvastatin). [akb]

Schmerzen

- Angina pectoris (Atorvastatin). [akb]
- Angina pectoris (Rosuvastatin). [akb]
- Das Herz plagt etwas. [ygw]

Schwäche

- Das Herz wird sehr schwach, man kann den Puls kaum tasten. [ygw]
- Verschlechterungen bei bestehender Kardiomyopathie. [hrh]

Rücken

Schmerz

- Beckenschmerzen (Rosuvastatin). [akb]
- Dumpfer, ziehender Schmerz über der Nierenregion, erstreckt sich nach unten ins Sakrum (3. Tag). [snp]
- Nackenschmerzen (CSE-Hemmer). [akb]
- Nackenschmerzen (Rosuvastatin). [akb]
- Rückenschmerzen (3%) (Rosuvastatin). [akb]

- Rückenschmerzen (6%) (Fluvastatin). [akb]
- Rückenschmerzen (Atorvastatin). [akb]
- Rückenschmerzen (CSE-Hemmer). [akb]

Extremitäten

Ataxie

- Ataxie. [hrh]

Kälte

- Merkwürdig ist, dass im Schmerzanfall die linke Hand erkaltet. [gon]

Koordination

- Ataxie (Lovastatin). [akb]
- Koordinationsstörung (CSE-Hemmer). [akb]

Schmerz

- Ein dumpfer Schmerz über der rechten Hüfte, mit Wundheit auf Druck, erstreckt sich herum auf die Vorderseite. [snc]
- Kein Rheumatismus mehr, außer im Fersenballen und da nur, wenn es regnet. [ygw]

Schwellung

- Die Knochen der Finger sind knorrig. [btj]
- Die Unterschenkel schwellen an von den Knien abwärts, schlimmer um die Knöchel. [ygw]
- Knöchelödem (Atorvastatin). [akb]
- Knöchelödem (Lovastatin). [akb]
- Ödem der unteren Gliedmaßen (CSE-Hemmer). [akb]
- Ödem, untere Gliedmaßen (Rosuvastatin). [akb]

Schlaf

- Ruhte die ganze Nacht und konnte am nächsten Morgen in den Laden, obwohl noch etwas schwach und wund. [ygw]

Schlaflosigkeit

- Gallensteine und Schlaflosigkeit. [bew]
- Schlaflosigkeit (Lovastatin). [hrh]
- Schlaflosigkeit. [btj]

Schlafstörung

- Schlafstörungen (0,1%). [hrh]
- Schlafstörungen (0,5-1%) (Lovastatin). [akb]
- Schlafstörungen (3%) (Fluvastatin). [akb]
- Schlafstörungen (Atorvastatin). [akb]
- Schlafstörungen (CSE-Hemmer). [akb]

- Schlafstörungen (Lovastatin). [hrh]
- Schlafstörungen (Pravastatin). [akb]
- Schlafstörungen (Rosuvastatin). [akb]
- Schlafstörungen. [hrh]

Träume

- Albträume (CSE-Hemmer). [akb]
- Albträume (Simvastatin). [akb]

Frost

- Am nächsten Tag Frost um 15 Uhr, mit Schmerz in der [rechten] Seite. [ygw]
- Hatte Wechselfieber und wurde zweimal gegen Pocken geimpft. [btj]
- Leichter Frost um etwas 19 Uhr, mit Schmerz in der [rechten] Seite. [ygw]
- Schüttelfrost (CSE-Hemmer). [akb]
- Schüttelfrost (Lovastatin). [akb]

Fieber

- Fieber (CSE-Hemmer). [akb]
- Fieber (Lovastatin). [hrh]
- Fieberkrisen & Diarrhoe. [hrh]
- Hohes Fieber um 22 Uhr, fühlte sich aber nicht, als hätte er eine Gallenkolik. [ygw]

Schweiß

Reichlich

- Hyperhidrosis (Atorvastatin). [akb]

Haut

Blutung

- Ekchymosen (CSE-Hemmer). [akb]
- Ekchymosen (Rosuvastatin). [akb]
- Petechien (Atorvastatin). [akb]
- Petechien (CSE-Hemmer). [akb]
- Purpura (CSE-Hemmer). [akb]
- Purpura (Pravastatin). [akb]
- Purpura (Simvastatin). [akb]
- thrombozytopenische Purpura (Simvastatin). [akb]

Empfindlichkeit

- Fotosensibilisierung (CSE-Hemmer). [akb]

- Fotosensibilisierung (Lovastatin). [akb]
- Fotosensibilisierung (Simvastatin). [akb]
- Photosensibilität (Lovastatin). [hrh]

Farbe

bräunlich

- Bräunlich-gelbe Flecken am ganzen Körper. [vnh]
- Die Haut war gelbbraun und kachektisch. [btj]

gelb

- [Die Magenschmerzen] gingen nie mit Ikterus einher. [aew]
- Cholestatischer Ikterus (Lovastatin). [hrh]
- Farbveränderung der Haut (Fluvastatin). [akb]
- Gelb, Ikterus. [ane2], [bew6], [can2]
- Ikterus - cholestatischer (Pravastatin). [akb]
- Ikterus (Atorvastatin). [akb]
- Ikterus (CSE-Hemmer). [akb]
- Kein auffallender Ikterus. [aew]
- Sie war ikterisch, musste Erbrechen und war krank, in Schweiß gebadet. [btj]

Hautausschläge

- Dermatitis (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Dermatitis (Fluvastatin). [akb]
- Dermatitis (Pravastatin). [akb]
- Dermatitis, bullöse (Fluvastatin). [akb]
- Dermatitis, bullöse (Rosuvastatin). [akb]
- Ekzem (Atorvastatin). [akb]
- Ekzem (Fluvastatin). [akb]
- Ekzem (Pravastatin). [akb]
- Erythem (CSE-Hemmer). [akb]
- Erythema exsudativum multiforme (CSE-Hemmer). [akb]
- Erythema exsudativum multiforme (Fluvastatin). [akb]
- Erythema exsudativum multiforme (Pravastatin). [akb]
- Erythema exsudativum multiforme (Simvastatin). [akb]
- Exantheme (0,4%). [hrh]
- Flush (CSE-Hemmer). [akb]
- Flush (Lovastatin). [akb]
- Flush (Simvastatin). [akb]
- Hautausschlag - auch vesikulobullöses Exanthem (Rosuvastatin). [akb]
- Hautausschlag (3%) (Pravastatin). [akb]

- Hautausschlag (bis 4%) (Atorvastatin). [akb]
- Hautausschlag (bis 5%) (Lovastatin). [akb]
- Hautausschlag (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Hautausschlag (Fluvastatin). [akb]
- Hautausschlag (Lovastatin). [hrh]
- Hautausschlag, (3-5%) (CSE-Hemmer). [akb]
- Hautausschläge. [hrh]
- Kontaktdermatitis (Atorvastatin). [akb]
- Lichtdermatose (Simvastatin). [akb]
- Lupus-ähnliches Syndrom (Lovastatin). [hrh]
- Lupus-erythematodes-ähnliches Syndrom (CSE-Hemmer). [akb]
- Lupus-erythematodes-ähnliches Syndrom (Fluvastatin). [akb]
- Lupus-erythematodes-ähnliches Syndrom (Pravastatin). [akb]
- Makulöses Exanthem (CSE-Hemmer). [akb]
- Psoriasis vulgaris - Einzelberichte (CSE-Hemmer). [akb]
- toxische epidermale Nekrolyse (CSE-Hemmer). [akb]
- Urtikaria - auch Dermographismus (Atorvastatin). [akb]
- Urtikaria (Atorvastatin). [akb]
- Urtikaria (CSE-Hemmer). [akb]
- Urtikaria (Fluvastatin). [akb]
- Urtikaria (Lovastatin). [hrh]
- Urtikaria (Pravastatin). [akb]

Jucken

- Juckreiz (Lovastatin). [hrh]
- Pruritus (3%) (Atorvastatin). [akb]
- Pruritus (3%) (Fluvastatin). [akb]
- Pruritus (4%) (Pravastatin). [akb]
- Pruritus (5%) (Lovastatin). [akb]
- Pruritus (CSE-Hemmer). [akb]
- Pruritus (Rosuvastatin). [akb]

Schuppen

- Seborrhö (Atorvastatin). [akb]

Allgemein

Abmagerung

- Abmagerung. [aew]
- Anorexie (Lovastatin). [hrh]

- Gewichtsabnahme (Lovastatin). [akb]
- Hat seit November Gewicht verloren. [btj]

Abszess

- Cholesterin im Eiter. [aew]

Allergien

- allergische Reaktion (2%) (Fluvastatin). [akb]
- allergische Reaktion (bis 3%) (Atorvastatin). [akb]
- Allergische Reaktion (CSE-Hemmer). [akb]
- allergische Reaktion (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Hautreaktion, allergische (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]

Anaphylaktischer Schock

- Anaphylaktische Reaktion (CSE-Hemmer). [akb]
- anaphylaktische Reaktion (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- anaphylaktische Reaktion (Pravastatin). [akb]
- Anaphylaxie (Lovastatin). [hrh]

Ateriosklerose

- Cholesterin in atheromatösen Bildungen der Gefäßhäute. [aew]

Bewegung

- Bewegungsstörung (CSE-Hemmer). [akb]
- Gangstörung (CSE-Hemmer). [akb]

Blut

- Blutbildungsstörung (CSE-Hemmer). [akb]
- Blutgerinnungsstörung (CSE-Hemmer). [akb]

Blutdruck

- Blutdruckabfall (Pravastatin). [akb]
- Blutdruckabfall (Simvastatin). [akb]
- Hypertonie (Atorvastatin). [akb]
- Hypertonie (Rosuvastatin). [akb]
- Hypertonie. [mhd]
- Hypotonie. [hrh]

Blutung

- Blutung (Simvastatin). [akb]

Dystrophie

- Dystrophie. [hrh]
- Dystrophie (Tierexperimentell). [hrh]

Entzündung

- Arthritis (CSE-Hemmer). [akb]
- Arthritis (Fluvastatin). [akb]
- Arthritis (Lovastatin). [akb]
- Arthritis (Lovastatin). [hrh]
- Arthritis (Rosuvastatin). [akb]
- Arthritis (Simvastatin). [akb]
- Bursitis (CSE-Hemmer). [akb]
- Dermatomyositis (CSE-Hemmer). [akb]
- Dermatomyositis (Lovastatin). [akb]
- Dermatomyositis (Pravastatin). [akb]
- Dermatomyositis (Simvastatin). [akb]
- Myositis - vereinzelt bis zu 2 Jahre nach komplikationsloser Therapie (CSE-Hemmer). [akb]
- Myositis (Atorvastatin). [akb]
- Myositis, häufiger bei Komedikation mit Ciclosporin, Gemfibrozil u.a. (CSE-Hemmer). [akb]
- Myositis. [hrh]
- Polymyositis (Simvastatin). [akb]
- Tendopathie (Pravastatin). [akb]
- Tendosynovitis (CSE-Hemmer). [akb]v
- Vaskulitis (CSE-Hemmer). [akb]
- Vaskulitis (Fluvastatin). [akb]
- Vaskulitis (Lovastatin). [akb]
- Vaskulitis (Pravastatin). [akb]
- Vaskulitis (Simvastatin). [akb]

Ergüsse

- Cholesterin in hydropischen Transsudaten. [aew]

Erkältung

- Erkältung (7%) (Pravastatin). [akb]

Fettleibigkeit

- Gewichtszunahme (Atorvastatin). [akb]
- Gewichtszunahme (CSE-Hemmer). [akb]
- Gewichtszunahme (Fluvastatin). [akb]
- Gynäkomastie (CSE-Hemmer). [akb]
- Gynäkomastie (Pravastatin). [akb]

Fraktur

- Knochenbruch - pathologischer (Rosuvastatin). [akb]

Geschichte

Eigenanamnese

- Er hatte als junger Mann in den Niederungen des Wabash schwere Attacken von Wechselfieber. [ygw]

Gestalt

- Dünn, schwach, verdorben. [btj]
- Hagere Gestalt. [aew]
- Sie war sehr dünn und machte einen verdorbenen Eindruck. [btj]

Grippe

- Grippeähnliches Syndrom (2%) (Rosuvastatin). [akb]
- Grippeähnliches Syndrom (5%) (Fluvastatin). [akb]
- Grippeähnliches Syndrom (bis 3%) (Atorvastatin). [akb]
- Grippeähnliches Syndrom (CSE-Hemmer). [akb]

Hitze

- Hitzewallung (Pravastatin). [akb]

Impfung

- Erkrankte schwer in unmittelbarem Anschluss an die Revaccination. [gon]

Infektion

- häufig Infektion (Rosuvastatin). [akb]
- Infektion (bis 10%) (Atorvastatin). [akb]
- Virusinfektion (2%) (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]

Jahreszeiten

- Verschlechterung der Beschwerden im Frühjahr und Herbst. [btj]

Kachexie

- Der Patient ist kachektisch, die Haut ist gelbbraun, die Konjunktiven sind gelb und Schlaflosigkeit ist vorhanden. [bal]

Krämpfe

- häufig Muskelkrampf (1%) (Lovastatin). [akb]
- Muskelkrampf (3%) (Fluvastatin). [akb]
- Muskelkrampf (Atorvastatin). [akb]
- Muskelkrampf (CSE-Hemmer). [akb]
- Muskelkrämpfe (Lovastatin). [hrh]

Krankheitsgefühl

- Allgemeines Krankheitsgefühl (Lovastatin). [hrh]
- Krankheitsgefühl am ganzen Körper. [ygw]

Krebs

- Ameke behauptet, viel Erfolg bei der Behandlung von Leberkrebs gehabt zu haben. [btj]
- Cholesterin in Krebsgeschwülsten. [aew]
- Kanzerogenität (Tierexperimentell). [hrh]
- Kanzerogenität möglich – nach Hochdosierungen bei der Maus vermehrt hepatozelluläre Adenome und Karzinome sowie Papillome der Magenschleimhaut (Lovastatin). [akb]
- Kanzerogenität möglich - nach Hochdosierungen bei Mäusen vermehrt Karzinome und Adenome der Leber, Adenome der Lunge (Simvastatin). [akb]
- Kanzerogenität möglich - vermehrt Brustkrebs unter Pravastatin (4,2%) in Placebo (0,3%) kontrollierter Studie, durch andere Untersuchungen nicht bestätigt, nach Hochdosierungen bei der Ratte vermehrt hepatozelluläre Karzinome (Pravastatin). [akb]

Labor

- absetzen: Anstieg über das 10fach der Norm: 0,2-0,4%) (Rosuvastatin). [akb]
- Alkal. Phosphatase erhöht (Atorvastatin). [akb]
- Alkal. Phosphatase erhöht (Fluvastatin). [akb]
- Alkal. Phosphatase erhöht (Lovastatin). [akb]
- Alkal. Phosphatase erhöht (Rosuvastatin). [akb]
- Alkal. Phosphatase erhöht (Simvastatin). [akb]
- Als Zeichen des Enzymdefektes kommt es zu einer massiven Erhöhung der Mevalonsäure in allen Geweben und Flüssigkeiten des Körpers. [hrh]
- Amylase erhöht (Atorvastatin). [akb]
- Amylase erhöht (CSE-Hemmer). [akb]
- Amylase erhöht (Pravastatin). [akb]
- Amylase erhöht (Simvastatin). [akb]
- Anämie (CSE-Hemmer). [akb]
- Anämie (Lovastatin). [akb]
- Anämie (Pravastatin). [akb]
- Anämie (Rosuvastatin). [akb]
- Anämie (Simvastatin). [akb]
- Antinukleäre Antikörper (ANA) positiv (CSE-Hemmer). [akb]
- Antinukleäre Antikörper positiv (Lovastatin). [akb]
- Antinukleäre Antikörper positiv (Pravastatin). [akb]
- Blutsenkung beschleunigt (Pravastatin). [akb]
- Blutsenkung beschleunigt (Simvastatin). [akb]
- BSG-Beschleunigung (CSE-Hemmer). [akb]
- BSG-Beschleunigung (Lovastatin). [hrh]
- CK-, Transaminasen-Erhöhungen (1,3%). [hrh]
- CPK-Erhöhung - bei Anstieg über das Zehnfache der oberen Norm (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]

- CPK-Erhöhung - bei Werten über dem 5fachen der oberen Norm: Rosuvastatin. [akb]
- CPK-Erhöhung - bis zum Dreifachen der oberen Norm (bis 5%), bei über Fünffachem der Norm (CSE-Hemmer). [akb]
- CPK-Erhöhung (11%) (Lovastatin). [akb]
- CPK-Erhöhung (3-4%) (Simvastatin). [akb]
- CPK-Erhöhung über das 3-fache der oberen Norm (2,5%) (Atorvastatin). [akb]
- Durch den Enzymdefekt entsteht ein Mangel an den Endprodukten des Biosyntheseweges des Cholesterins (Abb. 1.5, 4.1) und der hieraus entstehenden Produkte (wie Aldosteron, Cortison, Sexualhormone, NNR (Nebennierenrinden-Steroide) usw.) aber auch der nicht steroidalen Isoprenoide. [hrh]
- eine Konzentrationsänderung bei Ubichinon-10 in Folge von Einnahme von CSE-Hemmern. [hrh]
- Eine vollständige Blockade der Cholesterinsynthese ist mit dem Leben nicht vereinbar (*Brown* und *Goldstein* 1980). [hrh]
- Eosinophilie (Fluvastatin). [akb]
- Eosinophilie (Lovastatin). [akb]
- Eosinophilie (Pravastatin). [akb]
- Eosinophilie (Simvastatin). [akb]
- Erhöhung der Leberenzyme. [hrh]
- Fibrinogen erhöht (Atorvastatin). [akb]
- Gamma-GT erhöht (CSE-Hemmer). [akb]
- Gamma-GT erhöht (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Gamma-GT erhöht (Simvastatin). [akb]
- Geringgradige, i. d. R. vorübergehende Erhöhungen der Transaminasen sind kurz nach Therapiebeginn möglich (Lovastatin). [hrh]
- Hämolyse (Fluvastatin). [akb]
- Hämolyse (Lovastatin). [akb]
- Hämolyse (Pravastatin). [akb]
- Hämolytische Anämie (CSE-Hemmer). [akb]
- Hämolytische Anämie (Fluvastatin). [akb]
- hämolytische Anämie (Lovastatin). [akb]
- Hämolytische Anämie (Lovastatin). [hrh]
- hämolytische Anämie (Pravastatin). [akb]
- Harnstoffspiegel erhöht (CSE-Hemmer). [akb]
- Hepatopathien, Transaminasen-Erhöhungen (Tierexperimentell). [hrh]
- Hyperbilirubinämie (Simvastatin). [akb]
- Hyperbilirubinämie (CSE-Hemmer). [akb]
- Hypercholesterinämie. [vnh1]
- Hyperglykämie (Atorvastatin). [akb]
- Hyperkaliämie (Lovastatin). [akb]

- Hypoglykämie ferner Hemmung von P-Glykoprotein (Atorvastatin). [akb]
- In 1,3% eine Erhöhung der Serum-Transaminase und der Creatinase. [hrh]
- LDH-Erhöhung (CSE-Hemmer). [akb]
- Leukopenie (CSE-Hemmer). [akb]
- Leukopenie (Pravastatin). [akb]
- Leukopenie (Simvastatin). [akb]
- Leukozytopenie (Lovastatin). [hrh]
- Lipase erhöht (Atorvastatin). [akb]
- Lipase erhöht (CSE-Hemmer). [akb]
- Lipase erhöht (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Lipase erhöht (Pravastatin). [akb]
- Positive ANA (Lovastatin). [hrh]
- Selten wurde, gewöhnlich nach 3 bis 12 Monaten, eine deutliche (über das Dreifache der Norm) Erhöhung der Transaminasen beobachtet (Lovastatin). [hrh]
- Serumkreatininanstieg (CSE-Hemmer). [akb]
- Serumkreatininanstieg (Simvastatin). [akb]
- Thrombozytopenie (Atorvastatin). [akb]
- Thrombozytopenie (CSE-Hemmer). [akb]
- Thrombozytopenie (Fluvastatin). [akb]
- Thrombozytopenie (Lovastatin). [akb]
- Thrombozytopenie (Lovastatin). [hrh]
- Thrombozytopenie (Pravastatin). [akb]
- Thrombozytopenie (Simvastatin). [akb]
- Transaminasenanstieg - bei anhaltendem Überschreiten des dreifachen oberen Normwertes Therapie abbrechen (Fluvastatin). [akb]
- Transaminasenanstieg - über das Dreifache der oberen Norm (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Transaminasenanstieg (1%): bei Überschreiten des dreifachen oberen Normwertes Therapie abbrechen (Pravastatin). [akb]
- Transaminasenanstieg (1%, unter 80 mg/Tag: 2%), bei anhaltendem Anstieg auf das Dreifache der oberen Norm und darüber Simvastatin absetzen (Simvastatin). [akb]
- Transaminasenanstieg (Atorvastatin). [akb]
- Transaminasenanstieg (bis 1,5%), bei Werten anhaltend 3fach über der oberen Norm Lovastatin ggf. absetzen (Lovastatin). [akb]
- Transaminasenanstieg (CSE-Hemmer). [akb]
- Thrombozytopenie(Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Über Abweichungen anderer Leberfunktionsparameter, einschl. Erhöhung der alkalischen Phosphatase u. des Bilirubins, wurde berichtet (Lovastatin). [hrh]
- Ubichinon-Erniedrigungen. [hrh]

- Vorübergehend leichte Erhöhungen der CK sind möglich (Lovastatin). [hrh]

Längenwachstum

großgewachsene Menschen

- Er ist groß und stattlich. [ywa]

Mattigkeit, Müdigkeit

- Fühlte sich nicht so wohl wie gewöhnlich; kann kaum sein Tagespensum erledigen. [ygw]
- Mattigkeit. [aew]
- Müdigkeitsgefühl. [ygw]
- Sehr starke Ermunterung (Heilwirkung). [ygw]

Missbildung

- Fehlbildungen. [hrh]
- *Hoffmann* (1994) schreibt, dass die vorgeburtlichen und progredienten Schädigungen im Kleinkindesalter, die unter der Mevalonazidurie auftreten auf „ein besonders hohes Risiko bei der Anwendung dieser Arzneimittel (gemeint sind die CSE-Hemmstoffe) bei Kindern und Schwangeren hinweisen". Die CSE-Hemmstoffe hätten sich in hohen Dosen als teratogen (*Minsker* et al. 1983, Surani et al. 1983) erwiesen und tierexperimentell als karzinogen (Lovastatin). [hrh]
- Teratogenese, Fehlbildungen, Fehlgeburten (Tierexperimentell). [hrh]
- Teratogenität möglich - nach Daten aus Tierversuchen (Simvastatin). [akb]
- Teratogenität möglich - nach Daten aus Versuchen bei einigen Tierspezies (Lovastatin). [akb]
- Tierexperimentell wurden Tumoren und Fehlgeburten hervorgerufen. [hrh]

Modalitäten

- Aufstoßen (Rülpsen) und Flati (Furzen) zeigen an, dass die Beschwerden am Verschwinden sind. [crv]
- Der Auslöser für die Beschwerden sind immer spätes Essen abends und nachts und zu vieles Essen. [crv]
- Er konnte nur eine bestimmte Menge zu sich nehmen, ohne Beschwerden zu bekommen. [crv]
- Ist er übermüdet oder hat er einen Schlafmangel, kann er sicher Leberbeschwerden erwarten. [crv]
- Ruhen, vollständige Entspannung und Schlafen können vorübergehende Linderung bringen. [crv]
- Wenn er die Speisen zu schnell zu sich nimmt, dann ist es eine Frage weniger Stunden, bis die Leber empfindlich reagiert. [crv]

Müdigkeit

- Müdigkeit (2%) (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Müdigkeit (3%) (Fluvastatin). [akb]
- Müdigkeit (CSE-Hemmer). [akb]
- Müdigkeit (Lovastatin). [akb]

Muskeln

- In seltenen Fällen eine reversible Myopathie mit Muskelschmerzen und -Schwächen, Augenmuskellähmungen einschließlich einer Rhabdomyolyse gefunden. [hrh]
- Myopathie - bei Verdacht absetzen (Fluvastatin). [akb]

- Myopathie. [hrh]
- Myopathien, CK-Erhöhungen (Tierexperimentell). [hrh]
- Myopathien, Muskelschmerzen (0,1%), Muskelschwäche, Augenmuskellähmungen, Rhabdomyolyse. [hrh]
- Rhabdomyolyse - dosisabhängig: unter der nicht empfohlenen Hochdosis von 160 mg bis 1% (Simvastatin). [akb]
- Rhabdomyolyse (CSE-Hemmer). [akb]
- Rhabdomyolyse. [hrh]
- Tod durch Rhabdomyolyse (CSE-Hemmer). [akb]

Nerven

- Neuropathie (CSE-Hemmer). [akb]
- Neuropathie (Simvastatin). [akb]
- Neuropathie, periphere (Atorvastatin). [akb]
- Neuropathie, periphere (Fluvastatin). [akb]
- Neuropathie, periphere (Lovastatin). [akb]
- Neuropathie, periphere (Simvastatin). [akb]
- Periphere Neuropathie – kann Monate und Jahre nach Absetzen anhalten (CSE-Hemmer). [akb]
- Polyneuropathie (Atorvastatin). [akb]
- Polyneuropathie (CSE-Hemmer). [akb]

Periodik

- Den ersten [Schmerz]-Anfall halb 7 Uhr früh – ehe er noch was genossen hat. [gon]
- Ebenso pünktlich erfolgt ½ 3 Uhr ein Paroxysmus, der aber nur bis 15 Minuten währt. [gon]
- Er bekommt seine Schmerzanfälle noch und zwar mit der Pünktlichkeit einer Uhr. [gon]
- Es erübrigt zu bemerken, dass abends 8 Uhr (früher um 9) der letzte Anfall kommt. [gon]

Rekonvaleszenz

- Eine Attacke fesselte ihn mehrere Wochen ans Bett und erst nach langer Zeit erholte er sich von den schlimmen Folgen. [ywa]

Rheumatismus

- Der Rheumatismus plagt etwas seit dem Regenwetter, etwas lähmig in den Schultern und unter den Fersen. [ygw]
- Die rheumatischen Schmerzen, hier und da, benötigen gelegentlich noch der Behandlung, besonders bei feuchtem, regnerischem Wetter. [ygw]
- Rheumatische Schmerzen hier und da, schlimmer bei feuchtem, regnerischem Wetter. [ygw]
- Rheumatismus mal besser mal schlechter. [ygw]

Ruptur

- Sehnenriss - Einzelbericht (Simvastatin). [akb]
- Sehnenriss (Atorvastatin). [akb]
- Sehnenriss (Pravastatin). [akb]

Schmerzen

- Arthralgie (0,5-1%) (Lovastatin). [akb]
- Arthralgie (bis 5% (Atorvastatin). [akb]
- Arthralgie (CSE-Hemmer). [akb]
- Arthralgie (Lovastatin). [hrh]
- Arthralgie (Rosuvastatin). [akb]
- Arthralgie (Simvastatin). [akb]
- Die Attacken beginnen und enden plötzlich. [ywa]
- Gelenkbeschwerden (CSE-Hemmer). [akb]
- Gliederschmerzen (CSE-Hemmer). [akb]
- häufig Arthralgie (4%) (Fluvastatin). [akb]
- Knochenschmerzen (CSE-Hemmer). [akb]
- Muskelschmerz (1%) (Simvastatin). [akb]
- Muskelschmerz (2%) (Pravastatin). [akb]
- Muskelschmerz (2,5%) (Lovastatin). [akb]
- Muskelschmerz (3%) (Rosuvastatin). [akb]
- Muskelschmerz (bis 5%) (Fluvastatin). [akb]
- Muskelschmerz (bis 6% (Atorvastatin). [akb]
- Muskelschmerzen (CSE-Hemmer). [akb]
- Muskelschmerzen (Lovastatin). [hrh]
- Myopathie (5%) (Atorvastatin). [akb]
- Myopathie (CSE-Hemmer). [akb]
- Neuralgie (Rosuvastatin). [akb]
- Polymyalgia rheumatica (Lovastatin). [akb]
- Polymyalgia rheumatica (Lovastatin). [hrh]
- Polymyalgie (CSE-Hemmer). [akb]
- Schmerzen (10%) (Pravastatin). [akb]
- Schmerzen (5%) (Atorvastatin). [akb]
- Schmerzen (CSE-Hemmer). [akb]
- Schmerzen (Rosuvastatin). [akb]
- Selten wurde über Myopathien berichtet; bei diffusen Myalgien u. Muskelschwäche u./od. deutlicher Erhöhung der CK (das Zehnfache der Norm) soll an die Entwicklung einer Myopathie gedacht werden (Lovastatin). [hrh]
- Tendopathie (CSE-Hemmer). [akb]

Schwäche

- Alle paar Tage fühlt er sich vollkommen geschafft. [ygw]
- Asthenie (Lovastatin). [hrh]
- Muskelschwäche (Atorvastatin). [akb]

- Muskelschwäche (CSE-Hemmer). [akb]
- Myasthenie (CSE-Hemmer). [akb]
- Schwächezustand (1,5%) (Simvastatin). [akb]
- Schwächezustand (3%) (Rosuvastatin). [akb]
- Schwächezustand (bis 4%) (Atorvastatin). [akb]
- Schwächezustand (Fluvastatin). [akb]
- Schwächezustand (Lovastatin). [akb]
- Schwächezustand (Pravastatin). [akb]
- Sehr schwach, kann nicht tief atmen. [ygw]

Schwellung

- Angiödem (Ezetimib, Hemmung der Cholesterinabsorbtion). [akb]
- Angioödem (CSE-Hemmer). [akb]
- Angioödem (Lovastatin). [hrh]
- Nicht gesicherte, aber gemeldete Ödeme (Lovastatin). [hrh]
- Ödem - generalisiertes (Atorvastatin). [akb]
- Ödem (Lovastatin). [akb]
- Ödem (Simvastatin). [akb]

Sensibilität

- Parästhesien (0,5-1%) (Lovastatin). [akb]
- Parästhesien (Atorvastatin). [akb]
- Parästhesien (CSE-Hemmer). [akb]
- Parästhesien (Fluvastatin). [akb]
- Parästhesien (Lovastatin). [hrh]
- Parästhesien (Rosuvastatin). [akb]
- Parästhesien (Simvastatin). [akb]
- Sensibilitätsstörung (Fluvastatin). [akb]
- Sensibilitätsstörungen (CSE-Hemmer). [akb]

Speisen

- Er liebt Salz sehr und isst eine Menge davon. [btj]

Tremor

- Tremor (Fluvastatin). [akb]
- Tremor (Lovastatin). [akb]
- Tremor (Pravastatin). [akb]

Tumor

- Cholesterin in obsoleten Tuberkeln. [aew]

Unverträglichkeit

- Häufig Therapieabbruch wegen Unverträglichkeit (1%) (Fluvastatin). [akb]
- Therapieabbruch wegen Unverträglichkeit (2%, zu einem Drittel wegen Transaminasenanstieg) (Lovastatin). [akb]
- Therapieabbruch wegen Unverträglichkeit (2%) (Pravastatin). [akb]
- Therapieabbruch wegen Unverträglichkeit (3-4%) (Rosuvastatin). [akb]
- Therapieabbruch wegen Unverträglichkeit (5%) (Simvastatin). [akb]

Unwohlsein

- Sei nie krank gewesen, aber fühlte sich unwohl, aber er hat viele Medikamente eingenommen: Bromide und Chloral, Urethran. [btj]
- Unwohlsein (CSE-Hemmer). [akb]
- Unwohlsein (Atorvastatin). [akb]

Verstoffwechslung

- Substrat für P-Glykoprotein (Lovastatin). [akb]
- über CYP 2C9 (Fluvastatin). [akb]
- über CYP 2C9 (Rosuvastatin). [akb]
- über CYP 3A4 (Atorvastatin). [akb]
- über CYP 3A4 (Lovastatin). [akb]
- über CYP 3A4 (Pravastatin). [akb]
- über CYP 3A4 (Simvastatin). [akb]

Wachstum

- Er ist ein großer, beleibter Mann. [ygw]

Wetter

- Schmerzen < bei feuchtem, regnerischem Wetter. [ywa]

Stages of Life, Constitution

- A country squire nearing seventy years of age came under my observation in the early part of 1889 for a very large tumour clearly connected with the left lobe of the liver. Patient was so ill that he reached town with difficulty, and became so weak that it was impossible for him to return. [btj]
- A few days since I saw his wife on her own account, when she reported him "quite well." [btj]
- A homoeopath for half a century he had boundless faith in Nux vomica, but I told him that I was sure Nux would not cure him, and as this visibly depressed him, I said I would give him lily medicine, but ill alternation with it he should have his Nux. Hence this was given in alternation with Cholesterine. The tumour slowly, disappeared, the liver went down to the state it had been ill for forty years. The left lobe somewhat bulging, and patient returned to his country seat in about two months, and ever since he is not, as a rule, conscious of possessing a liver at all, though once in a way he feels a little uneasy ill the hepatic region. This I know, as Patient has long been worried with vesical catarrh, and for this I am now treating him, keeping all the time a certain amount of attention directed to the hepatic region in case of any further explosion; for I do not imagine that the cure thus far is a truly Hunterian one. [btj]
- About five years ago, a gentleman of 67 or thereabouts came tinder my observation for a swelling under the right ribs that competent authorities had diagnosed as of a cancerous nature. It had come a

good many months subsequent to all accident: a cab wheel having gone over the body at the part mentioned. He had been under a good West-end homoeopathic physician who had agreed, after a close examination to the diagnosis, and declared positively to the gentleman's wife that he had no hope whatever of curing the case, and he thought it his duty to say so. [btj]

- At the time of going to press this gentleman continues well. [btj]
- Ein Knabe von jetzt 14 Jahren erkrankte schwer in unmittelbarem Anschluss an die Revaccination. [gon]
- Emilie Dräger, neununddreißig Jahr alt, leidet seit zwei bis drei Jahren an zeitweisen, vom Essen unabhängigen „Magenschmerzen“. [aew]
- Five years have elapsed and there has been no recurrence of tumour, and during the whole of the five years the gentleman has only been away from his business for three weeks and that was to go to the seaside last August. [btj]
- Frau Geres, vierzig Jahr alt, leidet seit einem halben Jahre, nach einer Entbindung, an periodischen, circa alle acht Tage eintretenden äußerst heftigen Schmerzen. [aew]
- Frau S., 60 Jahre alt. Häufige Attacken von Gallensteinen mit Beteiligung der Leber und der Magengegend. [ygw]
- Herr B.F., 64 Jahre alt, schied seit drei Jahren Gallensteine aus. [ygw]
- Herr Bethke, zweiundvierzig Jahr, kräftiger, hagerer Constitution hatte vor fünfviertel Jahren Icterus gehabt und war seit der Zeit „magenleidend.“ [aew]
- Herr Böhmer, vierzig Jahr alt, mit geringem Fettpolster. [aew]
- Herr Fliesbach, achtundvierzig Jahr alt, gewöhnlicher Constitution, leidet seit zwei Jahren an periodischen, vom Essen gänzlich unabhängigen Schmerzen in der Gegend der Leber. [aew]
- I advised him to go to the Grand Hotel and quarter himself ill the sunny front high lip out of the dirt and din, and there abide. He did so, and a very pleasant abode that is: the still streaming ill; the quiet; and yet the outlook upon the seething mass below, which keeps from stagnation. [btj]
- I may relate one such. Summoned 60 miles into the country late one afternoon, to a supposedly 'dying lady of 60 odd years of age, I found her icteric, vomiting, bathed ill cold perspiration, very thin, defile; the pulse small and weak, and patient seemingly, almost moribund. The seat of the affection was the left lobe of the liver, extending to the left and towards the navel. That there were gallstones is probable, but, quite outside of the acute attack, there was a chronic affection of some kind in the region just named, evidenced by swelling and tenderness. Kali bich. 5 relieved; Cholesterine 3x and Iodof. 3x cured in a month, and, the case being of long standing. [btj]
- I ordered him six grains of the third decimal trituration of cholesterinum every, four *hours, and requested him to call in a few days. [btj]
- I would not be understood to maintain that a tumour which thus goes from drug action on the ubi morbus ibi remedium idea must necessarily recur, but that it may But I will continue on this same subject in my next chapter. [btj]
- In this case I myself originally gave a bad prognosis to the gentleman's wife, and it was the Cholesterine that brought life and hope into the matter. It is very difficult to cure a tumid mass of ally kind with one remedy: one needs Organopathy, Homoeopathy, Amekeanism, and empiricism, together with theories no end, if the full extent of the possible is to be attained. [btj]
- Nearly six years ago, indeed a little longer, as it was early in the year 1876, I was required to treat a liver case almost exactly like the foregoing one. But patient was not much over fifty. [btj]
- On January 30th, 1889, an American gentleman, confessing to sixty-five years of age, and on a visit to his daughter, married to an English clergyman in the north, was accompanied to my rooms by the said

daughter, so ill was he that had I thereafter heard of his immediate demise I should have been not in the very least astonished. [btj]

- Orthodoxy well represented had given him up; and his profound adynamia and cachectic look warranted me in stating that I had but small hope. But he was a plucky fellow-a type of the British aristocrat (born to govern and fit therefor: because living out of doors and not reading books-Beaconsfield) and he was willing to obey to the letter. [btj]
- The note taken at the time stands thus in my case book under the above date. Thin, weak, defile; yellow conjunctivae, insomnia: very nervous and apprehensive. Been treated for enlarged liver and had lots of calomel and chloral. His skin is tawny, cachectic. There is a swelling of the liver or of the pancreas-probably malignant disease of the left lobe of the liver. Always suffered from dyspepsia. Been a great ocean traveller. " I am very fond of salt, and eat a great deal." Is a practical teetotaler. Bones of the fingers very knobby. He is spring-and-fall ailer. Has lost a stone weight since November. Never been ill but ailing, and has, taken much medicine: bromides and chloral, urethran. Very chilly. He is very ill. Urine normal. Has had ague, and been twice vaccinated. [btj]
- The whole thing was quite cured with the remedies in about a year; the most striking, palpable result being observed after the use of Cholesterine in different dilutions, though numerous remedies were needed as well, notably Carduus mariaeØ, Chelidonium majusØ, Myrica cerifera 3x, Iodium 1, Kali bich. 5, and Nat. mur. 6 trit. [btj]
- True, the tumour is gone and may never recur, and the gentleman has a very healthy look; but, after all, the tumour is not itself the disease, but the disease-product. [btj]
- With the sole addition of Medorrh. C. the treatment was as in the last case, and of about the same duration, viz., about a year, and with ail equally satisfactory result: he got well, and has remained well to date, working very hard almost all the time. This I know, as he has come about four times a year to be assured that his old enemy had been, not merely scotched, but killed. [btj]
- years of age then, and it arose primarily, it was thought, from adhesive peritonitis of long before. For years this gentlemen, a county man, had felt the jolting in a carriage at first uncomfortable, and latterly so painful that he had got into the habit of holding his hand against the swelled part to support it and prevent its feeling the effects of the shaking. [btj]

Vergleichende Arzneien

Vergeblich verordnete Arzneien

- Bis dahin kann man es an Stelle von Morphium in solchen Fällen benutzen. [ahc]
- Die Ärzte können nur Morphium in Mengen verschreiben, das ihn so krank macht, dass er sich danach sehr elend fühlt und deswegen immer fast eine Woche von der Arbeit fernbleiben muss. [ygw]
- Ebenso wenig leistete nennenswerte Dienste die von mir gereichte Sepia ^{003} und Sepia 1:500. [aew]
- Eine allopathische Kur mit Karlsbader Salz hatte scheinbar keinen Eindruck gemacht. [aew]
- Eine allopathische Kur mit Terpentinöl hatte scheinbar keinen Eindruck gemacht. [aew]
- Nach einer Gallenkolik lag er mehrere Wochen im Bett und es erforderte eine Menge Zeit, die Nebenwirkungen des Morphiums zu überwinden. [ygw]
- Nux. vomic. besserte den Zustand nur vorübergehend. [aew]
- Und dies nach Fehlschlägen mit Nux, Cinchona, Carduus, Podophyllum und anderen offensichtlich gut gewählten Mitteln. [ahc]

Synergismus

- Bei gleichzeitiger Behandlung mit Erythromycin wurde über Rhabdomyolysen mit u. ohne Verschlechterung der Nierenfunktion berichtet (Lovastatin). [hrh]

- Die meisten Patienten, die eine Myopathie entwickelten, wurden gleichzeitig mit Immunsuppressiva oder Fibraten oder Nicotinsäure (in der zur Lipidsenkung empfohlenen Dosis) behandelt (Lovastatin). [hrh]

Ausgangssubstanz

- Das erste Statin, Lovastatin, ist ein Naturprodukt, das im Jahr 1978 als Fermentationsprodukt des Schimmelpilzes Aspergillus terreus isoliert wurde. Es ist auch im Rotschimmelreis enthalten, ein traditionelles chinesisches Nahrungs- und Heilmittel. Die weiteren ersten Wirkstoffe Simvastatin und Pravastatin sind eng mit Lovastatin verwandt. Die anderen Wirkstoffe wurden vollsynthetisch entwickelt. [pai]

Vergleiche

- Carduus marianus, Chelidonium majus, Chionanthus, Iris versicolor. [bal]
- Cholesterine is lily sheet-anchor in organic liver disease in which the commoner hepatics-Chelid., Carduus, Myrica, Kali bich., Merc., and Diplotaxis tenuifolia have failed. [btj]
- In letzterer Beziehung sei bemerkt, dass dem Knaben Lycopodium noch am auffälligsten wohltat. [gon]
- Kali bich. 5 linderte; Cholesterine 3x und Iodof. 3x heilten innerhalb eines Monats, und die Besserung hielt lange an. [btj]
- The whole thing was quite cured with the remedies in about a year; the most striking, palpable result being observed after the use of Cholesterine in different dilutions, though numerous remedies were needed as well, notably Carduus mariae Ø, Chelidonium majus Ø, Myrica cerifera 3x, lodium 1, Kali bich. 5, and Nat. mur. 6 trit. [btj]
- Vergleiche: Natrium taurocholicum in der Homöopathie. [bew]

Complementär:

- Colateral: Berb. Calc-bil. Card-m. Chel. Chin. Hydr. Lyc. Mag-s. Mand. Nat-s. Podo. Tauroch. [rna]
- Inimical (feindlich, Antidot?): Lec. [rna]

Quellen

- Allen H.C. Nosoden. Berg: Barthel & Barthel 1987. [ahc]
- Allen H.C. The Materia Medica of the Nosodes with Provings of the X-Ray. Calcutta: Sett Dey & Co. 1942. [ahc]
- Ameke Wilhelm. Versuch zu einer Therapie auf Grundlage der Chemie des Menschen. Zeitschr. d. Berliner Vereins Homöopathischer Ärzte ZBV (1882) Bd.1 S.323-371. [aew]
- Assmann E. Funktionelle Pathologie und Homöopathie. Ein Kapitel über die homöopathische Behandlung der Leber- und Gallenblasenentzündung. AHZ 181 (1933) S.167. [ane]
- Blackwood A.L. A Manual of Materia Medica Therapeutics and Pharmacology. Zitiert nach Encyclopedia Homoeopathica RADAR. [bal]
- Blackwood A.L. Diseases of Liver, Pancreas and Ductless Glands. [bda]
- Boericke W. Handbuch der homöopathischen Materia medica. Heidelberg: Haug 1992. [bew]
- Boericke W. Pocket Manual of Homoeopathic Materia Medica. Philadelphia: Boericke & Tafel 1927. [bew]
- Burnett J.C. Diseases of the Liver. [btj]
- Carr V.T. Cholesterine. Homoeopathic Recorder (1941) Vol.57, Sept. p.129. [crv]
- Clarke J.H. Dictionary of Practical Materia Medica. [cej]

- Currim A.N. The Collected Works of Athur Hill Grimmer. Greifenberg: Hahnemann International Institute of Homoeopathic Documentation 1996. [can]
- Eisenbrand G. Schreier P. Römpp Lexikon Lebensmittelchemie. Stuttgart: G.Thieme 2006 [esr]
- Farrington E.A. Lesser Writings. [fne]
- Goullon. Ein kitzlicher Fall. AHZ, 25. April 1895, Band 130, No.17-18, S.135. [gon]
- Holtmeier H.-J. CHOLESTERIN. Zur Physiologie, Pathophysiologie und Klinik. Berlin: Springer 1996. [hrh]
- Jones E.G. Cancer: Its Causes, Symptoms and Treatment. [jse]
- Michaud. Das biologisch-klinische Problem des dauernden arteriellen Hochdrucks. AHZ 199 (1954) S.279. [mhd]
- Mohanty N. Text Book of Homoeopathic Materia Medica. [myn]
- N.N. Cholesterine, see: Homeopathic World, 1882, page 214. [wnn]
- Nuhn P. Naturstoffchemie. Stuttgart: Hirzel 1997. [nnp]
- Pharmawiki : https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Statine. [pai]
- Phatak S.R. Homöopathische Arzneimittellehre. Göttingen: Burgdorf 1998. [pks]
- Phatak S.R. Materia Medica of Homoeopathic Medicines. [pks]
- Pollmer U. Warmuth S. Lexikon der Populären Ernährungsirrtümer. Frankfurt a.M.: Eichborn 2004. [pru]
- Pulford A. Homoeopathic Materia Medica of Graphic Drug, Picture and Clinical Coments. [pda]
- Rehman Abdur. Encyclopedia of Remedy Relationships in Homoeopathy. Heidelberg: Haug 1997. [rna]
- Sankaran P. Notes on Nosodes. In The Elements of Homoeopathy. Bd.1 Bombay: Homoeopathic Medical Publishers 1996. [snp]
- Swan S. Clinical Notes. Homoeopathic World (1882) S.214. [sns]
- Swan S. Miscellaneous Provings: Cholesterine. The Homeopathic Physician, July, 1886, page 258. [sns]
- Voisin H. Materia Medica des homöopathischen Praktikers. Heidelberg: Haug 1969. [vnh]
- Witzig F. Extrahierte Quelle, deren Sigel verloren ging. [wnn]
- Yingling W.A. Hom. Rec. 44, 654, 1929. [ygw]
- Yingling W.A. Cholesterinum. Medical Advance, (1908) p. 549-551. [ygw]